

Medicinos priemonė Ranigast S-O-S

Kramtomosios tabletės

- PALENGVINA GASTROEZOFAGINIO REFLIUKSO SIMPTOMUS (pavyzdžiui, rėmenį ir skrandžio skausmą)
- MAŽINA RŪGŠTINGUMĄ
- APSAUGO SKRANDŽIO GLEIVINĘ

1. Identifikavimas, sudėtis ir paskirtis

Ranigast S-O-S yra skirtas gastroezofaginio reflukso simptomų, pavyzdžiui, rėmens ir skrandžio skausmo, malšinimui.

Ranigast S-O-S leidžia kontroliuoti padidėjusį skrandžio rūgštingumą, išvengti deginimo pojūčio, skrandžio skausmo ir dispepsijos.

Ranigast S-O-S yra veiksminga priemonė, nesvarbu, dėl kokios priežasties kilo problema. Be to, jis gali būti vartojamas kaip pagalbinė priemonė gastritu sergantiems pacientams.

1.1 Veikimo mechanizmas

Ranigast S-O-S sudėtyje yra skirtingų skrandžio aplinkoje sinergiškai veikiančių medžiagų derinys. Ypatinga sudėtis, kurioje yra natrio alginato, algininės rūgšties, natrio hidrokarbonato, kalcio karbonato, užtikrina greitą poveikį.

Alginatai yra ypatingi, iš tam tikrų rūšių dumblių išskirti polisacharidai. Patekusios į rūgštinę skrandžio aplinką, šios skaidulos labai greitai pradeda formuoti gelį, o šis padengia ir apsaugo skrandžio gleivinę.

Hidrokarbonato ir karbonato derinys neutralizuoja rūgštinę skrandžio terpę. Be to, reaguojant su vandenilio chlorido rūgštimi susidarę anglies dioksido burbuliukai sulaikomi alginato gelyje, šis virsta putomis, plūduriuojančiomis skrandžio sulčių paviršiuje, ir sumažina reflukso epizodų kiekį.

1.2 Sudėtis

Kiekvienoje tabletėje yra: 200 mg natrio alginato, 50 mg algininės rūgšties, 80 mg natrio hidrokarbonato, 140 mg kalcio karbonato.

Pagalbinės medžiagos

Manitolis, sukralozė, silicio dioksidas, augalinis magnio stearatas, glicerolio behenatas, imbierų ekstraktas, imbierų eterinis aliejus, citrinų kvapioji medžiaga, mėtų kvapioji medžiaga.

2. Pakuotė

Kiekvienoje dėžutėje yra 12 arba 24 tabletės.

3. Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusiems ir paaugliams (12 metų amžiaus ir vyresniems): rekomenduojama pavalgis vartoti 2 tabletes, po to galima užgerti šiek tiek vandens.

Vaikams (6-12 metų amžiaus): rekomenduojama pavalgis vartoti 1 tabletę, po to galima užgerti šiek tiek vandens.

Šios dozės veiksmingai sumažina padidėjusį skrandžio rūgštingumą ir apsaugo nuo gastroezofaginio reflukso. Neviršykite rekomenduojamos dozės.

4. Šalutinis poveikis

Medicinos priemonės **Ranigast S-O-S** sudėtyje esančios medžiagos yra saugios, visiškai suderinamos ir gerai toleruojamos; tai įrodyta specialiais tyrimais.

Vartojant dozes, kurių reikia norint pasiekti terapinį poveikį, pastebėtas šalutinis poveikis buvo vidurių užkietėjimas ir laikinas viduriavimas.

Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

5. Sąveika su maisto papildais ir vaistais

Apie medicinos priemonės **Ranigast S-O-S** sudėtyje esančių medžiagų sąveiką su maisto papildais nežinoma. Tačiau laikomasi bendros taisyklės, kad visus maisto papildus, įskaitant vitaminus, maistines medžiagas, žolinius ir homeopatinis vaistus, reikia suvartoti mažiausiai prieš dvi valandas iki **Ranigast S-O-S** vartojimo arba praėjus dviem valandoms po pavartojimo.

5.1 Vaistų sąveika

Dėl **Ranigast S-O-S** fizinių ir cheminių ypatybių vaistas gali sulėtinti arba susilpninti kartu vartojamų medžiagų ir vaistų absorbciją. Todėl prieš pradėdami vartoti į **Ranigast S-O-S** panašų produktą pasitarkite su gydytoju, ypač jei vartojate kontraceptines tabletes.

Ranigast S-O-S vartoti su tokiais vaistiniais preparatais kaip omeprazolas, cimetidinas ar cisapridas kontraindikacijų nėra; bet tokiais atvejais patartina pasitarti su gydytoju.

6. Laikymas

Ranigast S-O-S laikyti sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginio karščio ar šviesos šaltinių.

Nevartoti, jei pakuotė pažeista.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Priemonę laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

7. Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Medicinos priemonė iš esmės yra skirta vartoti vyresniems nei 18 metų amžiaus asmenims. Vis dėlto

Ranigast S-O-S kartais gali vartoti vyresni nei 6 metų amžiaus vaikai arba paaugliai, tačiau įspėjama, kad vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus dozę reikia sumažinti per pusę ir priemonę vartoti, kaip rekomenduojama. Jei abejojate, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Nėštumo ar žindymo laikotarpiu priemonę rekomenduojama vartoti tik pasitarus su gydytoju.

Neviršykite rekomenduojamos dozės, nes didesnis kiekis gali sukelti vidurių užkietėjimą arba laikiną viduriavimą.

Priemonės negalima vartoti esant lėtiniam vidurių užkietėjimui arba jei viduriuojama, sergant inkstų liga ar lėtiniu širdies nepakankamumu.

Ranigast S-O-S vartoti negalima ilgiau nei 30 dienų. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu po tam tikro laikotarpio vartojant priemonę simptomai nepalengvėja, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.

Kiekviena tabletė skirta vartoti tik vieną kartą. Tabletę iš lizdinės plokštelės reikia išimti iš karto prieš vartojant.

Tabletės nevertokite, jei žinote, kad Jums pasireiškė padidėjęs jautrumas produkto sudėtinėms medžiagoms.

8. Tinkamumo laikas

Nevartokite pasibaigus ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui.

Tinkamumo laikas taikytinas tik nepažeistai ir tinkamai laikomai pakuotei.

9. Atliekų tvarkymas

Pasibaigus tinkamumo laikui, priemonę reikia išmesti laikantis atliekų šalinimo reikalavimų.

Produkto ar jo pakuotės niekada neišmeskite į aplinką.




SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

ITALY



Platintojas:

ZF Polpharma SA

Ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Lenkija

Vēlāusia peržiūra 2021 m. kovo mėn.